

ATTILIO STEFANI, *La flora di Pirano : arricchita dell'Elenco delle piante indigene del territorio di Capodistria di Antonio Loser : [continuazione]*, in «Atti della I.R. Accademia degli Agiati di Rovereto» (ISSN: 1124-027X), s. 3 v. 1/1 (1895), pp. 209-240.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/atagr>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe - History, Religion and Philosophy Journals Online Access](#).

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe - History, Religion and Philosophy Journals Online Access](#) platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



(Continuazione vedi Atti accademici, anno 1894).

Bryonia dioica Jacq. == *Vite bianca*. Nei cespugli, e per i muri vecchi ed ombreggiati. Non la trovai che in Volparia dietro la villa Gabrielli, e nella Valle di Castel Venere. 4 Maggio.

Los: Momiano, e Lonche (1864).

Los: **Ecballion Elaterium Rich.** == *Schizzetti*. — Oltre (1864).

Campanulaceae.

Campanula bononiensis L. == *Raponzolo di Bologna*. Nei boschi e nei cespugli, di preferenza in collina, sparsa saltuariamente: Bosco dei preti, Narguzzano, Alberi ecc. 4 Luglio-Agosto.

Los: Cere, nei boschi C, AeM (1860).

Campanula Trachelium L. == *Imbuttini*. Fra i cespugli, di preferenza in luoghi alquanto umidi: piano della Valle di Strugnano, fondo della Valle di Fasano, Valderniga ecc. 4 Agosto. Rifioritura persino in Novembre.

Los: Capodistria, fra i cespugli C, AeM (1860).

Campanula pyramidalis L. == *C. pyramidale*. In luoghi sterili e piuttosto sassosi, e sui muri: sui piloni del Duomo di Pirano, sul declivio meridionale della Grotta di Glavizza, a Sezza, ecc. 4 Luglio-Settembre.

Los: Capodistria, Ospo, Popecchio, e Covedo (sui muri del Castello) (1860).

Campanula Rapunculus L. == *Raperonzolo*. Sparsa qua e là nei baredi e di preferenza fra i cespugli p. e.: Carbonaro Corte d'Isola, Sezza, Monte. 4 Maggio-Giugno.

Campanula sibirica? == *Campanella sibirica*. Zannichelli: nella regione (XI): Campanula media, folii inferius, candida lanugine vestita C. B. Pin. 94. (?).

Del resto la *C. sibirica* (*C. orecchiuta*) fu trovata da

Tomasini in luoghi rupestri alle terme di S. Stefano (*Bertol.*: Fl. it.)

Campanula glomerata L. = *C. a capolino*. Tanto in luoghi aridi, quanto nei cedui e nei boschi. Nelle vicinanze di Momiano, nei boschi del Carso, a S. Croce, sul monte Sella, a Sezza ecc. 24 Agosto-Settembre.

Los: Capodistria, in luoghi boscosi. C, AeM (1860).

Specularia Speculum DC. = *Specchietto di Venere*. Negli oliveti e nei campi frequente, ma non dappertutto; in copia maggiore e più diffusa nel Carso; p. e.: Villa Tartini, Sezza, Stanzia Bonetti in Scarlenia, Volparia e Borisia. 25 Maggio-Agosto.

VOLG: *Violette*.

Los: Capodistria, in luoghi coltivati, non ovunque (1860).

Specularia hybrida DC. = *Specchietto di Venere crespo*. Di preferenza in luoghi solatii, e tanto fra l'erba quanto nei campi; p. e.: sui colli della Cortina, a Vignole, a Castrolago, in Vallizza, a Sterna. 25 Maggio.

VOLG: *Violette*.

Los: S. Marco, luoghi erbosi (1860).

Los: **Campanula persicifolia L.** = *Giglio di S. Luigi*. Paugnano, Trusche. Settembre. C. AeM (1860).

Onagreae.

Epilobium Dodonaei Vill. = *Ramerino*. In collina, nei luoghi sterili e fra i sassi; piuttosto raro. Monte Ariòlo, Pisonone. 24 Agosto.

Los: S. Antonio, luoghi aridi ed inculti, AeM (1860).

Epilobium hirsutum L. = *Viola di padule*. Luoghi umidi della Valle superiore del Dragogna. 24 Agosto.

Los: Capodistria, sul Carso (1860). Pinguente nella Valle del Quieto, e alla Fontana di S. Niceforo (1860).

Los: Isola, acque stagnanti (1860).

Lythrum salicaria L. = *Salcerella*. In luoghi umidi e lungo i fossi, nei colli e nel piano, saltuario ma frequente: strada regionale presso S. Cristoforo, Fiesso, Fasano, Sezza, Sicciole, Porto Madonna sopra la cava di pietre. 24 Luglio-Agosto.

Los: Capodistria (1860), Socerga (1864).

Lytrum hyssopifolia L. = *Correggiola dei fossi*. Nei prati della Valle del Dragogna presso l'affioramento calcareo di S. Stefano; raro. 25 Settembre.

Los: S. Antonio, luoghi coltivati (1890).

Callitricha stagnalis Scop. = *Erba gamberaia*. Nelle acque stagnanti p. e. a Fisine nello stagno sito di fronte all'ultimo magazzino del sale, a Fiesso, alla fontana di Sezza e in quella del Gorgo. 24 Fiorisce quasi tutto l'anno.

Los: Capodistria (1864).

Grossulariaceae.

* **Ribes Grossularia L.** = *Uva spina*. Coltivato per suoi frutti, e talvolte simultaneamente come siepe, p. e. nel piano della valletta di Fiesso. 24 Aprile-Maggio.

Los: Boschi ombrosi del Taiano. C. (1860).

VOLG: *Ua de spin*.

* **Ribes rubrum L.** = *Ribes rosso, o comune*. Coltivato di frequente negli orti e nei campi, p. e. a S. Bernardino. 24 Aprile.

VOLG: *Ua de S. Giovanni*.

Los: **Ribes alpinum L.** = *Ribes alpino*. Boschi del Taiano (1860).

Myrtaceae.

Myrtus communis L. α) *melanocarpa DC.* = *Mirto*. Questa specie che nell'Istria meridionale (Stignano, Promontore, Brioni) forma delle intere macchie, qui è affatto ecce-

zionale; io non la trovai che sul ciglione del Mogorone sul coronale che fiancheggia la strada discendente a Calcariggie. 4 Giugno-Luglio. Frutti maturi in Marzo.

ZAN: (*Myrtus* com. *italica*. Tournef. Inst. R. H. 640) (XII).

* ***Eucalyptus globulus* Lab.** = *Eucalipto*. Coltivato con discreto successo su terreno siderolitico nella Stanzia Gabrielli in Carso; falli la coltivazione in suolo marno-arenaceo.

Leguminosae.

***Spartium junceum* L.** = *Ginestra*. Abbondante, in modo speciale uei luoghi rupestri marittimi, ove talora è fitto da formare delle piccole macchie; frequente nel territorio marno-arenaceo non però così nel calcareo: m. Ronco m. della Madonna, Pazzugo, Fiesso, Mostra, Mogorone, S. Bernardino, Promontorio di Sezza, alture di Lonzano, Obizzano, Luzzano, Cedola e Fatt' in là, saltuario sulla Costiera e in tutto il resto del Carso (strada Volparia-Salvore). 5 Maggio-Giugno.

VOLG: *Zanestra*, *Zinestro*.

ZAN: (*Gemista hispanica*, seu *Spartium arborescens* semibus lenti similibus, erectum. C. B. Pin 396) (VII).

Los: Capodistria, colli solatii. AeM (1860).

***Genista tinctoria* L.** = *Ginestrella*. Nei boschi e nei baredi, specialmente delle colline: Lonzano, S. Onofrio, Piani di Malio, Montecalvo, Zuccolo, e Lignevo. 5 Aprile-Giugno.

ZAN: (*Genista tinctoria germanica* C. B. Pin. 395) (III).

Los: Capodistria, luoghi boscosi, AeM — *β. ovata*, nel Carso (C) (1860).

***Genista elatior* Koch.** = *Baccellina*. In luoghi erbosi ed asciutti di ambedue le zone: nel Carso a Corona e Mazzoria, a Visinada presso Castel Venere, e presso Corte d'Isola a Fratta; Ceredo e Seamale. 5 Giugno-Luglio.

Los: Capodistria, prati aridi. AeM (1860).

Genista germanica L. == *Ginestra spinosa, Scardicci.* Nei baredi e nei cespugli, frequente ma molto saltuaria: Salvore, Madonna del Carso, Piovania, Tersie, pendii della Valderniga, Sezze di Padena, Malio e Momiano. 5 Maggio-Luglio.

Los: Capodistria, nei prati e nei pascoli (1860).

Genista silvestris Scop. == *Ginestrella di Carniola.* In luoghi sassosi e solatii; poco frequente: Montrino, Castel Venere, Durina presso S. Pietro dell'Amata, Saleto e Loreto. 5 Maggio-Giugno.

Los: Presso Ospo e Cernical (C) (1860).

MARCHI: Isola, nel territorio arenaceo-marnoso (1879).

Genista scariosa Viv. == *Ginestra cartilaginosa.* Nei cedui e nei cespugli di terreni rupestri come a Gardere, Pistano, Colombania, S. Pietro, e Porto Madonna. 5 Giugno.

Los: **Genista pilosa L.** == (*Ginestra pelosa*). Cernoti, luoghi erbosi; m. Taiano. Giugno (1860).

Los: **G. sericea Wulf.** == *Ginestra argentina.* Luoghi rupestri, erbosi di Lonche e del Taiano. Luglio, AeM (1860).

Cystisus Laburnum L. == *Maggiociondolo, Avorniello.* Su quello di Salvore anche inselvaticchito, ma più spesso coltivato per ornamento (Giardino Righetti, Villa Gabrielli), e talora come sostegno delle viti. 5 Maggio.

VOLG: *Solénio.*

Cytisus nigricans L. == *Maggio.* Nei boschi e nei cedui fitti: m. Sella, Valle dell'Acquaro, m. Narguzzano, Spezieria e Scarlenia. 5 Giugno-Luglio.

ZAN: (Cytisus. Clus. Hist. 96). (VI).

Los: Capodistria (Seen). C, AeM (1860).

Cytisus capitatus Jacq. == *Citiso ombrellato.* Nelle piezze incolte e nei cespugli, raro: Lonzano, Valderniga, Busa di Villanova. 5 Giugno-Luglio.

ZAN: (Cytisus septimus Clus. Hist. 96) (VI).

Los: Capodistria, luoghi cespugliosi (Seen). C, AeM (1860).

Cytisus hirsutus L. = (*Citiso irsuto*). Nei baredi cespugliosi, e nei boschetti di olmi e di castagni: Borisia, Sezza dietro l'Antennale, Narguzzano, Corgnoledo, Lavorè, e Valle dell'Acquaro verso Carcauze. 5 Marzo-Aprile.

ZAN: (*Cytisus septinus* Clus Hist. 96) (VI).

Los: Capodistria, pascoli aridi. AeM (1860).

Cytisus argenteus L. = *Citiso argentino*. Raro: pendici rupestri di Zuccolo e Montecalvo. 5 Maggio.

Los: Cerè, Cernical, Paugnano, luoghi aridi. AeM (1860).

Los: **Cytisus sagittalis Koch.** = *Ginestra alata*. Nei prati del Taiano. Giugno. C, AeM (1860).

Lupinus hirsutus L. = *Lupino peloso*. Lo trovai una sola volta nei campi di Borisia e in quelli al di sotto della Lanterna di Salvore, ove però è raro. 5 Giugno.

Forse accidentale. — So che qualche specie di *Lupinus* è stata coltivata nel territorio, però senza certo risultato.

Ononis antiquorum L. = *Stancabue, Brugnecola* (*O. spinosa L.*). Nei baredi, nei coronali, lungo le vie, nei boschetti, comune in tutto il territorio; p. e. sul Mogorone, sul Carbonaro, a S. Basso. 5 Maggio-Settembre.

Los: Capodistria, pascoli e vie (1860).

Ononis Columnae All. = *Bolimacola montana*. Nelle pendici erbose e solatie di Cellola, Sellore e Fernetto. Non frequente. 4 Maggio-Giugno.

Los: Capodistria, prati aridi. AeM (1860).

Ononis reclinata L. = *Bolimacola* (—?). Sparsa e rara in Canola, e così pure sulla Costiera e in Salvore. 5 Maggio.

Los: Isola, luoghi erbosi. C (1860).

MARCH: Isola, sul promontorio calcareo (1879).

Anthyllis Dillenii Schult. (*A. Vulneraria*, γ. *rubiflora* Koch).

= *Vulneraria*. Sparsa per tutto il territorio, specialmente nei baredi e nei pascoli: Salvore, Stanzia grande,

Valfontane, Santiane, Carbonaro, Cavrie, ecc. 4 Aprile-Luglio. Specialmente su quello di Salvore è accompagnata dalla δ . *polyphylla DC.*

Los: luoghi inculti di S. Antonio, e Villadecani Isola, Salera. C, AeM (1860).

MARCH: Isola, promontorio calcareo (1879).

Los: *Anthyllis montana L.* = *Vulneraria montana*. Luoghi erbosi del Taiano Giugno C. (1860).

Medicago sativa L. = *Erba Spagna*, *Erba medica*. È diffusa per tutto il territorio insieme alla β) *versicolor* Koch; p. e. prati della Cortina e di Sicciole, Valle di Castel Venere, Valderniga, ed anche lungo gli argini delle saline. 4 Maggio-Settembre.

VOLG: *Erba Spagna*.

Los: Capodistria, nei prati (1860).

Medicago falcata L. = *Medicago (falcata)*. È comune, però più frequente che altrove nei baredi soleggiati ove è accompagnata dalle varietà β . *versicolor* Koch, e γ . *glandulosa* Koch; p. e. a Sezza, sul Carbonaro e nella Stanzia grande. 4 Maggio-Settembre.

ZAN: (*Trifolium siliqua cornuta*, sive *Medica*, flore luteo. C. B. 380) (VI).

Los: Capodistria, nei prati (Seen). (1860).

Medicago prostrata Jacq. = *Medica sottile*. Di preferenza nei monti piuttosto elevati in luoghi aridi e soleggiati, non però abbondante: p. e. a Modiano, a Luzzano, a Fineda, a S. Pietro ecc. 4 Aprile-Giugno.

Los: Capodistria, pascoli asciutti (1860), m. di S. Antonio (1864).

Medicago lupulina L. = *Trifogliolino selvatico*. Comunissima nei prati, nei baredi, e lungo le vie; p. e. alla Cortina a S. Lucia, alla Mostra. La varietà β . *Wildewiana* Koch la riscontrai in Mazzoria, Spezieria ecc. 4 Giugno-Luglio.

Los: Capodistria, luoghi coltivati (Seen) 1860.

Medicago orbicularis All. = *Trafagliolo storto, Fondelo*. Nei

baredi e anche nei seminati; frequente in tutto il territorio; p. e. nella Valle dell'Acquaria, a Castrolago, in Fatti 'n là, a Valfontane, alla Madonna del Carso. ♀ Aprile-Maggio.

Los: Isola, in luoghi erbosi (1860).

ANNOT: (Non noto la specie *M. marginata*, perché, come ha osservato il Freyn, essa non è che uno stadio della *M. orbicularis*).

Medicago tribuloides Desr. = *Medica* (—?). Vicino al mare in luoghi erbosi, rara: Stanzia grande, Alberi, Borisia. ♀ Maggio-Giugno.

MARCH: Isola, sul promontorio (1879).

Medicago maculata Willd. = *Trifoglio di prato*. Nei pascoli e nei cedui: Scarlenia, Frattia, Corona, orti di Carrara di Raspo, però non copiosa. ♀ Maggio-Giugno.

Los: Capodistria, nei prati non ovunque (1860).

Medicago Gerardi W. k. = *Medica pelosetta*. Nei prati e nei campi di Strugnano, però poco frequente. ♀ Maggio.

Los: S. Nazario, ed Isola, nei prati (1860).

Medicago minima L. = *Trifogliolino lappoloso*. Nei pascoli aridi di tutto il Carso, come p. e. a Salvore, a Porto Madonna, in Canegra ecc. ♀ Maggio.

Los: Capodistria, pascoli aridi (1860).

Medicago apiculata Willd. = *Medica appunterellata*. Nei prati, nei coronali, e lungo i margini dei fossi: p. e. in Marzanè, a Strugnano, a Fiesso, a S. Lucia, e in Valle di Sicciole. ♀ Maggio-Agosto.

Los: Cerè, luoghi coltivati (1860).

Medicago denticulata Willd. = *Medica (denticolata)*. Nei prati, lungo i margini erbosi dei canneti, sugli argini delle saline: Strugnano, Valle di Fasano e di Sicciole. ♀ Maggio-Agosto.

Los: Capodistria, nei prati e nelle saline (1860).

Melilotus alba Desr. = *Meliloto bianco*. In luoghi affatto inculti, sassosi, o ghiaiosi, p. e. alla Mostra, a S. Bortolo, a Fisine, all'Antennale ecc. ♀ Giugno-Agosto.

Los: Capodistria, lungo le vie, e le acque (1860).

Melilotus officinalis Desr. = *Trifoglio cavallino*, *Erba vetturina*. Lungo le vie ed i pozzali, in luoghi sterili, sparso saltuariamente per tutti i colli ed il piano: p. e. alla Madonna di Strugnano, sul m. Maglio, a Corte d'Isola, a Sezza, in Vallizza, a Monte ecc. ♀ Maggio-Settembre.

Los: Capodistria, lungo le vie e le acque (1860).

Melilotus parviflora Desf. = *Tribolo graneloso*. Vicino ai canneti di Val di Sicciole, e nei campi di Tersie e di Marcottia. ♀ Giugno.

Los: Capodistria, luoghi coltivati. « Tommas. » (1860).

Melilotus italicica L. = *Meliloto (italiano)*. Lungo i muri e i margini erbosi dei campi coltivati di Pistano, Visinada e Montrino; non frequente. ♀ Maggio-Giugno.

Los: Castel Venere, in luoghi coltivati (1860).

Trifolium pallidum Wk. = *Trifoglio pallido*. In luoghi ombreggiati ed erbosi della Val Bombacca; piuttosto raro. ♀ Giugno.

Trifolium pratense L. = *Trifoglio dei prati*, *Bolognino*. Nei prati della Valderniga, della Val di Castel Venere, non che nelle siepi circostanti. ♀ Aprile-Luglio.

Los: Capodistria, prati e strade (Seen). C, AeM (1860).

Trifolium medium L. = *Trifoglio serpentino*. Nei boschetti erbosi del m. Sella, di Fiesso, e del m. Ronco. ♀ Maggio-Giugno.

Los: Villadecani, luoghi boscosi. AeM (1860).

Trifolium alpestre L. = *Trifoglio alpestre*. Nei baredi cesugliosi di Lonzano, Draga, ed Obizzano. ♀ Giugno-Agosto.

Los: Villadecani, Paugnano; nei boschi. (AeM) (1860).

Trifolium rubens L. = *Trifoglio rosso*. Nei baredi e sui coronali, nei cedui per tutto il territorio, p. e. a Fiesso a Roncaldo, nei piani di Malio, in Valfontane. 4 Giugno.

Los: Capodistria, nelle siepi. AeM. (Seen) (1860).

Trifolium ochroleucum L. = *Trifoglio giallognolo*. Molto saltuariamente sparso; nelle siepi e nei coronali: Pazzugo, Fisine, Ribila, Bosco, e Bassania. 4 Luglio-Agosto.

Los: Rosariol e Cerè. in luoghi erbosi (AeM) (1860).

Trifolium stellatum L. = *Trifoglio (stellato)*. Nei pascoli e nei cedui del Carso, p. e. nel bosco di Violinca in Scarlenia, in Melottia e a Monte. 5 Maggio-Giugno.

Los: Isola, luoghi erbosi. C (1860).

MARCH: Isola, promontorio (1879).

Trifolium angustifolium L. = *Trifoglio strigGINE*. In luoghi sterili poco erbosi e solatii, lungo i sentieri: frequente Strada regionale da Pirano a Castel Venere (al Monfort), Costiera del Carso, Fineda, Val di Piano, ecc. 5 Aprile-Maggio.

ZAN: (*Trifolium montanum augustissimum spicatum*, C. B. Pin. 2). (III).

Los: Capodistria, nei prati e per le vie. (Seen) (1860).

Trifolium incarnatum L. colla var. *orchroleuca*. = *Trifoglio incarnato*, F. Pesarone. Si trova in ispecial modo da Salvore in Scarlenia, ove del resto vien coltivato talora in vaste estensioni. 5 Maggio-Giugno.

Los: S. Nazario. Un solo esemplare nel Luglio 1858 (H.H)

MARCH: Isola, promontorio (1879).

Trifolium lappaceum L. = *Trifoglio lappolo*. Nei baredi, nei pascoli, nelle siepi non tanto abbondante ma comune: Valle dell'Acquaria, di Pazzugo, di Sicciole, Valfontane, Carbonaro, e Sezza ecc. 5 Maggio.

Los: Rosariol, nelle siepi: C, AeM (1860).

Trifolium Cherleri L. = *Trifoglio incamiciato*. Nei pascoli

di Salvore, di Alberi, e della Stanzia grande. ♀ Maggio-Giugno.

Los: Isola, in luoghi erbosi; C (1860).

MARCH: Isola, promontorio (1879).

Trifolium arvense L. = *Erba lepre, Piè di lepre*. Comunissimo nei campi, nei prati, nei coronali, sulle ghiaie; p. e. nel piano di Fiesso, sull'Ariolo, sul Sella, in Scarlenia, alla Mira, a Salvore. ♀ Maggio-Luglio.

Los: Tribano, Villadecani, in luoghi erbosi; C, AeM (1860).

Trifolium striatum L. = *Trifoglio volpino*. Nei prati e nei coronali frequente; p. e. a S. Lucia, in Canedo, a Sezza, in Val di Castel Venere, in Capitania, in Volparia ecc. ♀ Giugno.

Los: Capodistria, in luoghi erbosi, e nei colli; C, AeM (1864).

Trifolium scabrum L. = *Trifoglio (scabro)*. Lungo gli argini del Dragogna in Val di Sicciole molto saltuario, più frequente nel Carso come p. e. a Mafra, Spezieria e Selvella. ♀ Giugno.

Los: Capodistria, in luoghi erbosi ma non dappertutto (H. H). AeM (1860).

Trifolium subterraneum L. = *Trifoglio sotterraneo*. In luoghi erbosi fra i canneti di S. Lucia, e di Val di Sicciole. ♀ Giugno.

Los: Isola, sul promontorio calcareo (1864).

MARCH: Isola, sul promontorio calcareo (1879).

Trifolium fragiferum L. = *Trifoglio fragolino*. Nei prati di Strugnano, della Valle di Castel Venere, della Valderigna, lungo i margini dei fossi di Canedo e Marroco specialmente in vicinanza dei cosi detti bolasi. 24 Maggio.

Los: Capodistria, in luoghi inculti (1860).

Trifolium resupinatum L. = *Trifoglio trafiglino*. Sul promontorio calcareo d'Isola. (Marchesetti 1879). (nv).

Trifolium montanum L. = *Trifoglio montano*. Si trova di preferenza nei boschetti limitrofi a S. Onofrio, nonchè in quelli del m. Sella e del Narguzzano; nel Carso c'è in Marcottia. 4 Aprile-Maggio.

Los: Capodistria, in luoghi boscosi; C, AeM (1860).

Trifolium repens L. = *Trifoglio bianco*. Nel piano, tanto in luoghi erbosi ed ombreggiati come nei prati e lungo i fossi: Strugnano, Valle di Fasano, di Sicciole, di Castel Venere ecc. nel Carso in Valfontane e altrove. 4 Aprile-Giugno.

Los: Capodistria, in luoghi inculti (1860).

Trifolium nigrescens Viv. = *Trifoglio dei pascoli*, (*T. istriano*). È frequente nei pascoli e nei prati del Carso, come in Valfontane, ad Alberi, nella Stanzia grande ecc. non così nella zona arenaria, come p. e. al Comedone, e lungo il Libadore, e in Tersie. 5 Maggio-Giugno.

Los: Isola, in luoghi erbosi; C. (1860).

MARCH: Isola, in terreno marno-arenaceo (1879).

Trifolium procumbens L. (*T. agrarium*, β *campestre* Schreb). = *Lupollino*, *Ceccerello a palloncini*. Nei pascoli e nei cedui di tutta la regione del Carso, come p. e. sulla Costiera, a Montrino, in Punta e Volpia fino alla Grotta di Glavizza. 5 Maggio-Giugno.

Los: Isola, Castel Venere (1860).

Trifolium patens Schrb. = *Trifoglio dorato*. Nei prati del piano od in luoghi erbosi ed umidi; poco frequente: Strugnano, sponde del Dragogna, Canedo, e Scodellino. 5 Giugno.

Los: Capodistria, nei prati umidi, non raro (1860).

Los: **Trifolium maritimum Huds.** = *Trifoglio rigido*. S. Nazario nei prati. Maggio (1860).

Los: **T. panormitanum Pressl.** = *Trifoglio Gerbone*; a Capodistria nei maggesi (1864).

Dorycnium suffruticosum Vill. = *Trifoglino (semilegnoso)*. In luoghi aridi e rupestri della Val Bombacca poco lungi dalla Grotta di Glavizza. 5 Luglio.

Dorycnium herbaceum Vill. = *Trifoglino (erbaceo)*. È diffusissimo in tutto il territorio, e tanto in luoghi colti che incolti nel piano e nei monti; p. e. ai margini della strada regionale Pirano-Isola, e Pirano-Castel Venere. 4 Giugno-Agosto.

Los: Capodistria, in luoghi erbosi (1860).

Lotus ornithopodoides L. = *Vecchia lustrina*. Nei baredi, nei coronali, e in luoghi erbosi prossimi al mare: m. Carbonaro, Santiane, Strugnano, Borisia, e al di sotto della Lanterna di Salvore. 5 Maggio-Giugno.

BERT: Ex Istria prope Pirano et Umago a Tommasino (Fl. it.)

Lotus corniculatus L. = *Mulaghera*. Misto alla varietà β) *ciliatus* Koch, e sparso abbondantemente per tutto il territorio, specialmente nei baredi: Carbonaro, Santiane, Malio, Ceredo di Corte d'Isola, Costiera del Carso ecc. 4 Aprile-Agosto.

Los: Capodistria, nei prati e nei pascoli (Seen) (1860).

Los: Dintorni di S. Antonio (1864).

Lotus tenuifolius Rechb. = *Loto sottile*. In luoghi erbosi ed ombreggiati del piano come a Strugnano, in Valle di Fasano, a S. Lorenzo, a Limignano. 4 Aprile-Giugno.

Los: Capodistria, in luoghi coltivati e per le vie, raro (1860).

Tetragonolobus siliquosus Roth. = *Scandalida*. In luoghi umidi erbosi ed ombreggiati prossimi al mare, come a Strugnano vicino alla Peschiera Vatta, in fondo alla valletta di Pazzugo, a Fiesso, a S. Lucia presso le saline, in Ceredo, e al Ponte del Gurlo. 4 Aprile-Maggio.

ZAN: (Lotus, siliqua quadrata flore luteo H. Cath.) (VI).

Los: Capodistria, prati umidi (1860).

MARCH: Prati di Strugnano.

Robinia Pseudo-Acacia L. = *Acacia, Cascia, Robinia*. Coltivata in tutto il territorio ed anche inselvatichita, p. e. a S. Lorenzo, a Sezza a Salvore. 5 Maggio.

Galega officinalis L. = *Capragine, Avanese*. Nei prati di Lonzano presso il Grivino, e nei siti erbosi di S. Bartolo, nella Valle di Fasano da S. Lorenzo a Vignole. 4 Giugno-Settembre.

Los: Capodistria, luoghi erbosi e vie (1860).

Colutea arborescens L. = *Vescicaria*. Nel versante rupestre di Marcottia sopra la Val Bombacca, e nei boschetti del m. Sella; rara. 4 Giugno.

Los: Capodistria, nei boschi e nei cespugli (Zan.) C, AeM (1860).

Astragalus hamosus L. = *Meliloto falso*. In luogo erbosi della Costiera come nei dintorni di S. Pietro e Canegra. 6 Maggio.

Los: Isola, luoghi erbosi C (1860).

MARCH: Isola, sul promontorio (1890).

Astragalus glycyphyllos L. = *Liquirizia bastarda*. Nel bosco del Castelliere di Narguzzano verso la strada che conduce per Corte d'Isola, nei dintorni cespugliosi di Terebiti presso Carcauze, e di quelli di S. Stefano in Valle del Dragogna. 4 Maggio.

Los: Capodistria, non raro. C, AeM (1860).

Los: **Astragalus Wulfenii Koch.** = *Vecciarino rosato*. Capodistria, luoghi aridi e solatii. Aprile, C, AeM (1860).

Los: **A. vescicarius L.** = *Astragalo vescicoso*. Lonche, Cernoti, nei prati. C (1860).

Scorpiurus subvillosa L. = *Erba lombrica*. Nei coronali e nei baredi, frequente ma non in copia: m. Ronco, S. Spirito, S. Cristoforo, Piaggio, Porto Rose, Salvore. 6 Maggio.

Los: Isola, S. Marco, in luoghi erbosi (1860).

Coronilla Emerus L. = *Dondolino, Emero*. Diffusa in tutto il territorio ma specialmente nei coronali, nei baredi, e

nei dirupi: Ciglione del Mogorone, Medossi fino sull'Ariolo, Costiera ecc. 5 Aprile-Giugno; talvolta fino in autunno, e talvolta dal Febbraio.

ZAN: (*Coronilla siliqua et seminibus crassioribus* C. B. Pin 650) (IV).

Los: Capodistria, nei cespugli; C. AeM. (H. H) (1860). Covedo (1860).

Coronilla montana L. = *Scorpioides montana*. Nei baredi dei colli più alti: Carbonaro, Santiane, Ariolo, Seamale. 4 Maggio.

ZAN: (?) (VI).

Los: Capodistria, nei boschi e nei pascoli. C, AeM (1860).

Coronilla scorpioides Koch. = *Erba canterella*. Negli oliveti, e nei vigneti specialmente in luoghi erbosi, frequente; p. e. a Vignole, in Ribila, a Cellola, in Volparia. 5 Maggio-Giugno.

ZAN: (*Ornithophodium flore flavescente*. I. B. 2,350) (III).

Los: Capodistria, luoghi erbosi, e campi (1860).

MARCH: Isola, in terreno arenaceo-marnoso (1879).

Coronilla cretica L. = *Scorpioides striata*. In luoghi ombreggiati, vicino ai pozzali, e lungo i muri, frequente ma saltuaria, Saleto, Lavorè, Ratto del Piaggio, sentieri di S. Spirito, della Mostra, di Sezza ecc. 5 Maggio-Giugno.

Los: Capodistria, in luoghi erbosi, e per le vie (1860).

MARCH: Isola, in terreno marno-arenaceo (1879).

BIAS: Fra Isola e Pirano (1829).

Coronilla varia L. = *Vecciarini*. Nei baredi, nei coronali e nei boschetti frequente; p. e. sul Mogorone, a Castignole, a S. Lucia, a Cellola, a S. Onofrio, a S. Pietro dell'Amata, ed a Gardere. 4 Giugno-Settembre.

Los: Capodistria, prati, e vie (H. H) (1860).

Hippocrepis unisiliquosa L. = *Sferra cavallo maggiore*. Nei cespugli di luoghi erbosi: Valfontane, Monte e Alberi; rara. 4 Aprile.

Los: Isola, in luoghi erbosi; C (1860).

MARCH: Isola, sul promontorio (1879).

Securigera Coronilla DC. = *Securidaca*. In luoghi erbosi e piuttosto ombreggiati: a Strugnano lungo la strada lambente la Peschiera Vatta, in Valle dell'Acquaria, ai margini dei canneti e dei vigneti della Valle di Fasano, della Carresada, e di Ribila. 5 Maggio.

ZAN: (Securidaca lutea major. C. B. Pin 348) (III).

Los: Bassamarin, in luoghi erbosi (1860).

MARCH: Isola, in suolo arenaceo-marnoso (1879).

BIAS: Fra Isola e Pirano (Flora 1829).

Onobrychis sativa Lam. = *Cedrangola*, *Fieno maremmano*.

Nei prati della Cortina, nei baredi di Lonzano, e nei pascoli di Spezieria, e di Scarlenia. 4 Maggio-Giugno.

Los: Capodistria, nei prati (H. H) (1860).

Onobrychis arenaria DC. = *Cedrangola (delle arene)*. A Strugnano vicino alla spiaggia presso l'imboccatura della strada che conduce a Fiesso, ed alla Scala dei ponti a Fiesso. 4 Giugno.

Cicer arietinum L. = *Cecio*. Coltivata la varietà tanto a seme bianco, quanto a seme nero; talora fuggiasco ed inselvaticchito, p. e. nelle piezze di Sezza. 5 Maggio-Giugno.

VOLG: *Piziōi*.

Vicia Craca L. = *Cracca (maggiori)*. Nei prati umidi della Valle di Castel Venere, e della Valderniga. 4 Giugno.

Los: Capodistria, nei cespugli umidi. AeM (1864).

Los: **Vicia Pseudo-Craca Host.** Capodistria fra i cespugli, rara.

Vicia tenuifolia Roth. = *Cracca (tenuifolia)*. (Qualora come vuol Neilreich non si voglia mettere colla specie precedente). Nei coronali, e nei boschetti e nei campi: pendici di Fiesso (alla Fontana), di Cellola, Castelliere di Narguzzano, Castignole, Vignole, Vallizza e Scarlenia. 4 Giugno.

Los: Capodistria, nei cespugli e per le vie. C, AeM (Seen) (1860).

Vicia villosa Roth. = *Veccia (pelosa)*. Nei boschetti e lungo i viottoli ombreggiati, sparsa e molto saltuaria: Carbonaro, m. Maglio, Limignano, Nosedo, e Parezago. 24 Maggio-Giugno.

Los: Villadecani, in luoghi coltivati (1860).

MARCH: Isola, in terreno marno-arenaceo, la forma *varia* Host. (*V. dasycarpa* Ten). (1879).

Vicia Faba L. = *Fava*. Coltivata, e talora fuggiasca p. e. a Sezza. 25 Maggio.

VOLG: *Fava*.

Vicia narbonensis L. = *Veccia selvatica*. Nei seminati del Carso, ma probabilmente importata per foraggio. 25 Maggio.

Los: Barban, Villadecani (Tomm.) (Bias.) (1860).

Vicia bithynica L. = *Cicerchia dentellata* Nei pascoli e nelle siepi di Borisia, in quelli presso alla Lanterna di Salvore, del m. Mira, e a Corgnoledo. 25 Maggio-Giugno.

Los: Villadecani (1860).

MARCH: Isola, su terreno arenaceo-marnoso (1879).

BERT: Ex Istria in sepibus di Salvore a Biasoletto, et in herbis circa Pirano. (Fl. it.)

BIAZ: Lanterna di Salvore (1829).

Vicia sepium L. = *Veccia silvana*. Nei boschi del m. Sella sotto S. Pietro dell'Amata. 24 Giugno.

Vicia pannonica Jacq. β *purpurascens*. = *Veccia grappolosa*.

Nei campi di cereali e nei vigneti di Fineda, Montrino, Scarlenia, e nell'ascesa per S. Pietro dell'Amata. 25 Giugno.

Los: Cernical, sui muri vecchi. — β. presso Villadecani.

Vicia hybrida L. = *Pelona*. Per i viottoli, lungo i muri e sui coronali: S. Cristoforo, Fisine, Spilugola, Limignano. 25 Aprile-Luglio.

Los: S. Marco, in luoghi erbosi.

Vicia lutea L. = *Veccia gialla*. Tanto nei vigneti quanto nei cespugli: Marzanè, S. Odorico, Canedo, S. Croce, Pistano, Mazzoria. 25 Maggio-Giugno.

Los: Villadecani, campi, e cespugli (1860).

MARCH: Isola, in terreno-marnoso (1879).

*

Vicia grandiflora Scop. = *Farfallona*. Nei baredi e nei boschi, ma molto saltuaria: Carbonaro, Piani di Malio, Fratta, Zuccolo, Pantiago. ♀ Aprile-Maggio.

Los: Capodistria, nei prati (1860).

Vicia sativa L. = *Veccia nostrale*, *Veccia dolce*. Coltivata piuttosto di rado, ed inselvatichita. Nei campi di Santiane. ♀ Giugno.

VOLG: *Veccia*.

Los: S. Marco, luoghi coltivati (1860).

Vicia angustifolia Roth. = *Veccia sottile*. Nei baredi, nei coronali, ai margini erbosi della siepi, sparsa in tutto il territorio, p. e. a Pazugo, S. Spirito, Vignole, Limignano, e Stanzia grande. ♀ Aprile-Maggio.

Los: Capodistria, in luoghi coltivati (1860).

Vicia cordata Koch. Sul promontorio calcareo d' Isola (March. 1879) (nv). — Secondo *Neilreich* è una forma che sta fra la *V. sativa* e la *V. angustifolia*.

Vicia peregrina L. = *Veccia smussata*. Nei campi e nei cespugli, e più frequente in terreno calcareo: Mafra, Montrino, Fineda e più in là fino a Sternà; Corona, Valle dell'Acquaro verso Padena e Carcauze. ♀ Maggio.

Los: S. Marco, nelle siepi. C (1860).

MARCH: Isola, in terreno marno-arenaceo (1879).

BIAS: Fra Isola e Pirano (1829).

Vicia lathyroides L. = *Veccia serena*. Nei pascoli del Carso, come p. e. a Marcovazzo, Piovania, Simonettia, Capitania, ed anche sulla Costiera. ♀ Aprile.

Los: Castel Venere, in luoghi aridi (1860).

TOMM: Ex herbidis Istriae circa Umago (Fl. it.)

Vicia cassubica L. = *Veccia lenticchina*. Sul Taiano in luoghi boscosi; Giugno; C, AeM (1860).

Ervum hirsutum L. = *Veccia tentennino*. Nei campi e in luoghi sterili, Pistano, Visinada e Mazzoria. ♀ Aprile-Maggio.

Los: Castel Venere, in luoghi aridi (1860).

* **Ervum Lens L.** = *Lenticchia*. Coltivato in piccole proporzioni. ♀ Maggio.

VOLG: *Lente*.

Los: **Ervum nigricans M. B.** = *Tentennino lesinino*. Ospo, in luoghi soleggiati e cespugliosi. Maggio (1880).

Pisum arvense L. = *Pisello selvatico*. Vicino ai cespugli delle pendici di Fiesso e di Pazzugo. ♀ Maggio.

BERT: In campis circa Pirano a Tommasinio (Fl. it.)

Pisum sativum L. = *Pisello domestico*; vien coltivato ma si trova anche randagio ed inselvaticchito. ♀ Maggio.

Lathyrus Aphaca L. = *Fior galletto, Majerella*. Abbondante fra l'erbe dei coronali, del resto comune in tutto il territorio; p. e. sul Ciglione del Mogorone, in Calcarigie, sul Narguzzano, a Monte, ed a Salvore. ♀ Maggio.

Los: S. Marco, Isola, in luoghi coltivati (1860).

Lathyrus Nissolia L. = *Cicerchia semplice*. Nelle piezze coltivate di S. Spirito e di Sezza; poco frequente. ♀ Giugno.

Los: Cerè, fra le messi, raro (1860).

MARCH: Isola, in territorio marno-arenaceo (1879).

Lathyrus sphaericus Retz. = *Cicerchia scarlatta*. Nei pascoli di Borisia, e di quelli al di sotto della Lanterna di Salvore. ♀ Maggio.

Los: Tribano, in luoghi erbosi (1860).

BERT: Ex Istria prope Umago a Tommasinio (Fl. it.)

BIAS: Lanterna di Salvore (1829).

Lathyrus Cicera L. = *Mochi*. In luoghi erbosi dei colli di Marzanedo, Corgnoledo, Saleto, e Lonzano; piuttosto raro. ♀ Aprile-Maggio.

Los: Capodistria, in luoghi erbosi, non raro (1860).

MARCH: Isola, in terreno marno-arenaceo (1860).

Lathyrus sativus L. = *Ingrassa manzo, Cece nero*. Nei campi e lungo i viottoli: Ratto del Piaggio, Fisine, Malio, Cellola, e Volparia (Stanzia Gabrielli). ♀ Giugno-Luglio.

Los: S. Tomà, Carlisburgo, fra i cespugli e per le vie (1860).

Lathyrus setifolius L. = *Cicerchia capillare*. In luoghi aperti aridi e pascolivi: presso Castel Venere e da qui in giù per la Costiera sparso qua e là fino alla Chiesa di Salvore. 5 Aprile-Giugno.

Los: Cernical, Castel Venere, fra i cespugli (1860).

Lathyrus annuus L. = *Cicerchia pallida*. Fra i seminati delle piezze a Sezza ed a Vignole, raro. 5 Maggio.

Los: Villisano, luoghi erbosi. 1860 — var. *aurantiacus*, a Villadecani (1864).

MARCH: Isola, in luoghi coltivati, AeM (1860).

Lathyrus tuberosus L. = *Ghianda di terra*; nei prati umidi della Valle di Castel Venere e in quelli presso il Dragogna al di sotto di Terebiti presso Carcauze. 4 Agosto.

Los: Capodistria, nei prati AeM (1860).

Lathyrus pratensis L. = *Erba galletta*, *Pisello dei prati*. In luoghi cespugliosi ed erbosi, e nei boschi radi: m. Narguzzano, Cedola, Cellola, Lonzano, m. Sella, e nel Carso ai Gambassi e in Violinca ecc. 4 Maggio-Giugno.

Los: *β. uliginosus*. Capodistria, in luoghi erbosi. C, AeM (1860).

Lathyrus latifolius L. = *Rubiglione*, *Ceserone*. Comune in tutto il territorio e specialmente sui coronali, nei baredi e lungo le strade e i pozzali; p. e. sul Mogorone, a S. Cristoforo, a Fiesso, e a Salvore. 4 Maggio-Settembre.

BERT: **Lathyrus angulatus L.** = *Cicerchia scarlatta*. Ex Istria prope Umago a Tommasinio (Fl. it.)

Los: **Latbyrus stans** Vis. (*L. incospicuus* L.) = *Cicerchia minuta*. A Villadecani in luoghi inculti Giugno (1864).

Orobus vernus L. = *Orobo primaticcio*. Nei cespugli e nei boschi delle pendici solatie di Draga, Zuccolo e Verchi, ed a Fiesso vecchio, però non frequente. 4 Aprile.

Los: S. Marco, Cerè, fra i cespugli (1860).

Orobus variegatus Ten. = *Orobo screziato*. Nelle parti fitte ombrose, e piuttosto umide dei boschi e dei cedui: Ariolo, Draga, Zuccolo; poco frequente. 4 Maggio-Giugno.

Los: Monte Taiano, nei boschi (1860).

Orobus niger L. = *Orobo silvano*. In luoghi analoghi a quelli delle due specie precedenti, ma invece comune a tutto il territorio, p. e. in Grameneria di Fiesso, nel castagneto dietro l'Antennale, sulle pendici di Gardere, in Capitania, ecc. 4 Maggio-Giugno.

Los: Capodistria, nei boschi; C, AeM (1860).

Los: **Orobus albus L.** = *Orobo bianco*. Dintorni di Cernoti, nei prati; C (1860).

Phaseolus vulgaris L. = *Fagiolo*. Coltivato in molte varietà e talora fuggiasco. 5 Giugno-Settembre.

VOLG: *Fasolér*: (Ai semi *fasioi*, *fasoli*).

ANNOT: Si coltivano: *Phaseolus multiflorus* Wild. (a Sezza), *Glycine chinensis* Sims, (Carso. Villa Gabrielli), *Amorpha fruticosa* L. e *Sophora japonica* L. (parco Righetti), *Ceratonia siliqua* = (*Carrubo*) (nell'orto di Hahn al Paradiso).

Cesalpiniaceae.

* **Cercis Siliquastrum L.** = *Albero d'amore*, *Albero di Giudea*.

Vegeta rigogliosamente, ma coltivato: nei giardini del Carso, come p. e. in quello del curato di Salvore, alla villa Gabrielli, e nel parco della villa Righetti. 5 Maggio-Giugno.

* **Gleditschia triacanthos L.** = *Spina Cristi*. Coltivato come pianta ornamentale; p. e. alla villa Vatta di S. Martino di Sicciole. 5 Maggio-Giugno.

VOLG: *Spin del Signor*.

Mimosaceae.

* **Albizzia Julibrissin Benth.** Coltivata come pianta ornamentale: parco della villa Righetti e villa Gabrielli nel Carso. 5 Luglio

Amygdalaceae.

* **Amygdalus communis L.** = *Mandorlo*. Coltivata di preferenza nelle pendici solatii, e tanto nelle varietà a seme dolce o amarognolo, quanto a nocciolo duro e grosso, fragile e sottile. 5 Febbraio-Aprile.

VOLG: *Mandolér*.

* **Persica vulgaris Mill.** = *Pesco*. Coltivato in molte varietà: pesche cotogne (ossia duracine o pavie), pesche spicche (ossia spiccagnole), pesche noci. 5 Marzo-Aprile.

VOLG: *Perseghér*.

* **Prunus Armeniaca L.** = *Albicocco*. Coltivato di preferenza vicino alle case di campagna. 5 Aprile.

VOLG: *Armelinér*.

Prunus spinosa L. = *Prugnolo, Susino di macchia*. Comune; predilige i viottoli, i margini dei fossi, i luoghi rupestri: Ratto del Piaggio, Ceredo presso le saline di Fasano, Marrocco, Comedone, Scodellino, Costiera ecc. 5 Aprile-Maggio.

VOLG: *Brugnocolé*.

Los: Capodistria, nelle siepi (1860).

Prunus insititia L. = *Prugnolo da innesto*. In luoghi rupestri e solatii: nel Carso ai Gambossi, e in Marcottia.

5 Maggio.

Los: Carlisburgo; in luoghi aridi (1860).

VOLG: *Brugna selvadega*.

* **Prunus domestica L.** = *Pruno, Susino, Susino domestico*. Coltivato in numerossime varietà: a) frutti nero-porporini con sarcocarpo non aderente o aderente; b) frutti rosso-porporini con pruina bleù o con pruina bianca, c) frutti giallo d'oro, con punti rossi o senza. 5 Marzo.

Nella nomenclatura volgare regna la confusione.

* **Prunus avium L.** = *Ciliegio*. Coltivato da per tutto nella varietà: *taliana DC*, e *duracina DC*. 5 Aprile.

VOLG: *Zaresér*.

Los: Capodistria, nei boschi; AeM (1864).

* **Prunus Cerasus L.** = *Visciolo, Amarasco*. Coltivato tanto nella varietà *acida* Ehrb, (*Visciolo*¹), quanto nella varietà *marasca* Host, (*Amarasco, Ciliegio Agerotto*). 5 Aprile-Maggio.

VOLG: *Visciolér, Maraschér.*

Los: S. Marco, fra i cespugli (1860).

Prunus Mahaleb L. = *Ciliegio canino, Legno di S. Lucia.*

In luoghi sassosi solatii e nei cespugli: nel Carso a S. Pietro, in Corona ed in Volparia; non frequente. 5 Maggio.

Los: S. Marco, Cerè, Lonche, in luoghi boscosi, C (1860); Covedo, Castello di Brezzana.

ANNOT. Si coltivano anche il *P. laurocerasus L.* (Volparia: villa Gabrielli) e il *P. lusitanica L.*

Rosaceae.

Spiraea Filipendula L. = *Erba peperina, Filipendola*. Nei baredi, nei prati, e particolarmente in quelli del Carso: Santiane, Carbonaro, Bosumè, Valderniga, Volparia, Borisia, Salvore ecc. 5 Maggio-Giugno.

Los: Capodistria, nei prati C, AeM (1860).

Los: **Spiraea Aruncus L.**, = *Barba di Capra*. Nei boschi del Taiano, C (1860).

ANNOT: A Fiesso trovai nel Luglio 1883 la *S. oblongifolia W. K.*, pianta propria della parte montana dell'Istria; la suppongo una accidentalità.

Geum urbanum L. = *Benedetto, Ambretta selvatica*. Lo trovai soltanto nei cespugli umidi di Tersie, e in Valle di Castel Venere; qualche raro esemplare in Valle della Dragogna sotto Carcauze. 4 Giugno.

Los: Nei boschi del Taiano; C (1860).

¹) Da distinguersi dal *P. Cerasus coeciliana*, di polpa dolce, detto pure *Visciolo*.

Rubus fruticosus L. == *Rovo, More di macchia.* Insieme colla var. β . *discolor*; comune lungo le vie in siti ghiaiosi, rupestri, sterili: Costiera, Valle di Castel Venere, Marroco ecc. 5 Maggio-Giugno.

VOLG: *More de graia.*

Los: Capodistria, fra i cespugli (Seen) (1860). Dintorni di S. Antonio, Cernizza (1864).

Rubus tomentosus Borkh. == *Rovo (vellutato?)* In luoghi analoghi a quelli del precedente, ed anche nei boschi: m. Sella, Violinca, Sezza, Seamale, Fiesso. 5 Maggio-Giugno.

VOLG: *More de graia.*

Los: Luoghi montani di Cernoti e del Taiano; C, AeM (1860).

Rubus caesius L. == *Roro di fior bianco.* Lungo le vie, e di preferenza ai margini erbosi ed umidicci dei fossi; molto meno frequente che le altre due specie: Fiesso, Valle dell'Acquaria, Malio, Piani di Malio, Corte d'Isola, Comedone, Canedo, Marrocco, Scarlenia, Valfontane. 5 Giugno-Settembre.

VOLG: *More de graia tenere.*

Los: Capodistria, nei cespugli (1860).

Los: **Rubus Idaeus L.** == *Lampone selvatico.* Sul Taiano in quantità.

Fragaria vesca L. == *Fragola selvatica.* Di preferenza nei cedui erbosi, però sempre molto scarsa: Pendici di S. Onofrio, e di Lonzano, del m. Maglio, del m. Sella, e della discesa da Marcottia in Val Bombacca. 4 Aprile-Maggio.

Los: Capodistria, in luoghi erbosi (1860).

Fragaria collina Ehrh. == *Fragola di poggio.* Predilige le conche erbose ed alquante ombreggiate dei colli: S. Pietro del Carso, Valfontane, Fornasine in Scarlenia, Gardere, Valle dell'Acquaro presso Padena. 4 Maggio.

Los: Sul Taiano in luoghi erbosi. Giugno (1860).

Potentilla recta L. Nella foiba detta Rupa in Scarlenia. 24 Magg.

Potentilla hirta L. = *Fragolaccia rossa*. Nei baredi e nei pascoli soleggiati, comune, p. e.: Carbonaro, Ronco, Marzanedo, Pistano, m. Mira. 24 Giugno.

Los: Canzano, Isola, in luoghi erbosi. C, AeM (1860).

Potentilla reptans L. = *Erba pecorina*. In luoghi erbosi umidicci delle piccole convalli: Pazzugo, Fiesso, Noseda, Vignole, presso il laco alla villa Righetti, e nel Carso nelle conche alberate (Spezieria). 24 Giugno-Agosto.

Los: Capodistria, nei fossi e per le vie non dappertutto (1860).

Potentilla tormentilla L. Rara nei boschi di Zuccolo, frequente in Salvore nei boschi di Acacie. 24 Maggio-Luglio.

Los: Capodistria, nei boschi; AeM (1860).

Potentilla subacaulis Wlf. = *Fragola vellutina*. In tutti i luoghi inculti del Carso, ma specialmente sulle pendici soleggiate e rupestri abbondante: Castel Venere, S. Stefano Costiera, Alberi, Salvore ecc. 24 Marzo.

Los: Sul Carso da per tutto, C (1860).

Potentilla australis Kras. (*P. opaca Jacq*, v. *australis*). = *Fragolaccia primaticcia*. Nei baredi e nai pascoli ed ai margini erbosi dei viottoli: Bosco dei preti, Marzanè, Colli di S. Spirito, Pazzugo, Lonzano. ecc. 24 Marzo-Aprile.

Los: (*Potentilla verna L.*). Capodistria, nei prati asciutti AeM (1860).

Los: **Potentilla alba L.** = *Pentafillo bianco*. Sul Taiano, nei prati. Maggio, C (1860).

Agrimonia Eupatoria L. = *Acrimonia*, *Erba da andata*. Ai margini erbosi dei fossi, e specialmente in quelli dei canneti: Fiesso, Fasano, Ceredo, Sicciole, Valle dell'Aquaro presso Carcauze, ecc. 24 Giugno-Agosto.

Los: Capodistria, nei fossi e per le vie (1860).

Los: **Arenaria agrimonoides Neck.** = *Agrimonoides*. Sul Taiano (1860).

ANNOT: Secondo *Zan.* ci dovrebbe essere nel Carso: (*Quinquefolium album majus*, alterum C. B. Pin 325), *Potentilla alba L.*

Rosa canina L.¹⁾ Sparsa in tutto il territorio ed in forme diverse: $\beta.$ *opaca* Fries: Paderno, — $\gamma.$ *dumetorum*, nei boschi e nei cedui del monte Sella, — $\delta.$ *myrtifolia*, nelle siepi di S. Onofrio, di S. Croce, di Visinada, ecc. — $\delta.$ *sepium* (Hallier). Costiera, Gardere, Tersie, ecc. 5 Maggio-Giugno.

Los: Capodistria, Paugnano. C, AeM (1860).

ANNOT: A questa specie come a tutte le altre il volgo dà il nome di *Rosa selvadega*, ed ai *ballerini* (frutti) *scarazzacui*.

Rosa sempervirens L. Nei cespugli, lungo i muri, ai margini dei boschi, insieme colla varietà $\beta.$ *scandens*: — Fisine Paderno, Colombania, Scarlenia, Marcottia, ecc.

Los: Capodistria, (Seen), nelle siepi; AeM (1860), dintorni di S. Antonio (1860).

Rosa gallica L. Lungo i margini dei baredi e dei campi, piuttosto rara: Castignole, Albuzzano, Scodellino, e in Volparia. 5 Giugno.

Los: Capodistria, in luoghi aridi, AeM (1860).

Rosa rubiginosa L. Nei cespugli fitti di Gardere. 5 Giugno-Luglio.

Los: Capodistria, nelle siepi, rara, C (1860), Pietra pessola alle Porte di ferro (1860).

Rosa lutea Miller. $\beta.$ *punicea*. (*R. eleganteria L.*) Questa specie frequente in Puglia ed al Volturno la trovai soltanto a Fiesso presso un muricciuolo, e precisamente in Arze. 5 Aprile (1880).

Rosa arvensis L. Nei boschetti al di là di Tersie, nelle pendici sotto Merischie. 5 Giugno.

Los: Sul Taiano, nei boschi. C, AeM (1860). Boschi di Colmo (1864).

¹⁾ Questo genere, come il *Rubus*, meriterebbe un esame più accurato, che la mia assenza da Pirano non permise di fare.

Los. (1860): **Rosa pimpinellifolia** L. Sul Taiano nei prati aridi, Maggio. C.

Los: **R. reversa** W. Kit. Sul Taiano in luoghi boscosi. Giugno C.

Los: **R. rubifolia** Will. Sul Taiano, in luoghi erbosi, e nei boschi. Giugno C.

Alchemilla arvensis L. = *Ventaglini*. Lungo i margini erbosi dei viottoli ed in luoghi incolti di Gardere, Morosia e Caldania; non frequente. 5 Aprile-Giugno.

Los: Castel Venere, in luoghi soleggiati (1860).

Poterium polygamum W. K. = *Pimpinella, Salvastrella*. È comune nei baredi, nei prati, nei coronali; p. e. al Piaggio, a S. Spirito, a Fasano, a Malio, in Salvore ecc. 4 Maggio-Luglio.

Los: Capodistria, in luoghi erbosi; C, AeM (1860); dintorni di S. Antonio (1864).

ANNOT: Delle Rosacee si coltivano: *Rosa baxiana* (Orto P. Fonda) *R. centifolia*, *R. indica* L., *Kerria japonica* L. (= *Rosa dorata*), *Spiraea salicifolia* L., *S. ulmifolia* Scop. (villa Gabrielli in Volparia) *S. opulifolia* L.

Pomaceae.

Crataegus Oxyacantha L. = *Biancospino*. Comune; lungo i coronali, nei boschetti, in luoghi coltivati e non coltivati, p. e. sulla strada regionale da Pirano a S. Cristoforo, e in Salvore, ecc. 5 Aprile-Maggio.

VOLG: *Spin bianco* (anche alla specie seguente).

Los: Capodistria, nelle siepi; C, AeM (1860), Val Breziana (1864).

Crataegus monogyna Jacq. = *Spin bianco*. Insieme colla specie presente colla quale di solito si confonde. 5 Aprile-Maggio.

Los: Capodistria, nelle siepi; C, AeM (1860).

* **Crataegus Azarolus L.** = *Azaro*. Coltivato abbastanza frequentemente. 5 Aprile-Maggio.

VOLG: *Pomi nazarioi*.

Mespilus germanica L. = *Nespolo*. Coltivato di frequente, ed inselvaticchito di rado: lungo i margini dei baredi a Sezza. 5 Maggio.

VOLG: *Nespolér*.

Los: Capodistria, quasi indigeno; AeM (1860).

* **Mespilus japonica Tnb.** = *Nespolo del Giappone*. È ormai diffusamente coltivato non solo come albero ornamentale, ma anche come albero da frutto: Carrara di Raspo, Maccello. 5 Maggio.

Cydonia vulgaris Lam. = *Cotogno*. Coltivata di preferenza in pianura come a Fasano, e nella Valle di Sicciole; inselvaticchita non la trovai. 5 Maggio.

VOLG: *Codognér* (*Pomo codogno*, al frutto).

Los: Pradisioi, alle sponde dei fiumi. AeM (1860).

Pyrus communis L. = *Pero*. Coltivato in molte varietà.

5 Aprile.

VOLG: *Perér*.

Los: Capodistria, nei boschi; C, AeM (1860), boschi di Colmo (1864).

Pyrus malus L. = *Melo*. Coltivato in molte varietà, talvolta inselvaticchite: cedui di Lonzano, e boschi del m. Sella. 5 Maggio.

VOLG: *Pomér*.

Los: S: Marco, fra le siepi; C, AeM (1860), boschi di Colmo (1864).

Pyrus amygdaliformis Vill. = *Pero mandorlino*. Predilige i luoghi affatto incolti e solatii, quelli a terreno calcareo a quelli a terreno arenaceo: Castelliere di Narguzzano, Medossi, Cellola, Zuccolo, Pistano, Spezieria, Scarlenia, Grotta di Glavizza, pendici sopra la Val Bombacca. 5 Maggio.

VOLG: *Perátola selvadega*.

Los: Momiano ed Isola, in colli aridi e soleggiati; AeM (1864).

Sorbus domestica L. = *Sorbo domestico*. Generalmente è coltivato nella parte collinesca della regione arenaria, ma si trova anche inselvatichito nei baredi, e nei boschi: Narguzzano, Draga, Valderniga. 5 Maggio.

VOLG: *Sorbér, Sorvér* (ai frutti: *Sorbi, Sorvi*).

Los: Capodistria, nei boschi di *Q. pubescens*, e *F. ornus*.

Sorbus torminalis Crntz. = *Ciarardello, Baccarello*. È generalmente coltivato nelle colline della zona arenacea, ma si inselvatichisce, ed allora trovasi nei boschi: a Zuccolo, nelle pendici più basse; 5 Aprile.

VOLG: *Brincolér* (ai frutti: *brincole*, e son eduli quando son fradicie).

ZAN: (Sorbus torminalis Cast. dur 492) (VII).

Los: Capodistria, nei boschi; AeM (1860).

Los: **Sorbus Aucuparia L.** = *Sorbo selvatico, Sorbo ottobrino*. Capodistria, nei boschi; Aprile AeM (1860), sul Taiano C (1864).

Los: **S. aria Crntz.** = *Farinaccio*. Nei cespugli di Trusche e di Covedo, e sul Taiano; C (1860).

ANNOT: Alla villa Gabrielli in Volparia c'è pure la *Cydonia japonica Pers.* (= *Pero giapponese*).

Granataceae.

Punica granatum L. = *Melograno*. Coltivato in collina e di preferenza vicino alle case: 5 Maggio.

VOLG: *Pomo ingrani*.

Los: A Villadecani e ad Ospo selvatico, in quantità. (H. H), C, AeM (1860). Val Brezzana (1860).

Crassulaceae.

Sedum maximum Snt. = *Erba da calli, Erba di S. Giovanni*.

In luoghi soleggiati e sassosi nonchè lungo i muri, non però frequente: Castel Venere, Mafrà, Montrino, Marcovazzo. 5 Luglio-Settembre.

Los: Capodistria, in luoghi sassosi, e sui sui muri; C, AeM (1860).

Sedum album L. = *Riso del diavolo, Pinochiella.* Qua e là sui muri vecchi, ed in città sulle antiche mura nonchè sui piloni del Duomo; lo trovai anche ai Magazzini Sotto Sezza e a Corte d' Isola. 24 Giugno-Settembre.

Los: Capodistria, sui muri, non ovunque. C, AeM (1860), Cernizza, Covedo, sui muri del castello (1868).

Sedum acre L. = *Sempreviro acre.* In luoghi sassosi e soleggiati nonchè sui muri vecchi della Stanzia grande e dei Alberi. 24 Aprile-Giugno.

Los: Isola; C (1860).

Sedum sexangulare L. (*S. boloniense Lois.*) = *Erba pignola.* Comunissimo nei coronali soleggiati, sui muri tanto del piano che del monte; fra le pietre p. e.: lungo la strada regionale Pirano S. Bortolo, presso l' Espositura, e alla Grotta di Glavizza. 24 Maggio-Luglio.

ZAN: (*Sedum luteum minimum, non acre I.B. 3.649*) (III).

Los: Capodistria, in luoghi aridi e sui muri (Seen); Covedo. C, AeM (1860)

Sempervirum tectorum L. = *Sempreviro dei tetti.* È pianta poco diffusa: trovasi sui muri e sui tetti di Colombania (proprietà Conte Furegoni), di Marcottia, di Scarlenia ecc. 24 Luglio.

VGLO: *Articiocco selvadego.*

Los: Capodistria, sui tetti; C (1860).

Saxifragaceae.

Saxifraga tridactylites L. = *Erba lattaiola, Lucernicchia.* Nei pascoli ed in luoghi erbosi rupestri del Carso; p, e. sulla Costiera sotto S. Pietro, a Porto Madonna, sul m. Mira, a Castel Venere, in Scarlenia, ed ai Gambossi. 24 Aprile-Giugno.

Los: Castel Venere, e m. Taiano, in luoghi rupestri; C (1860).

Cornaceae.

Cornus sanguinea L. = *Sanguinello*. Comunissimo, lungo i viottoli, nei baredi, nei cespugli, specialmente nella parte collinosa, p. e. sul Mogorone, a Sezza dietro l'Antennale, ecc. 5 Maggio.

VOLG: *Sanguen, Corniál*.

Los: Capodistria, nei cespugli e nelle siepi; C, AM (1860) Draguccio (1864).

Cornus mas L. = *Corniòlo*. Nei boschetti del m. Sella, però non frequente; anche coltivato. 5 C, AeM.

Los: Capodistria, nei colli boscosi; C, AeM (1860), boschi di Colmo (1864).

Umbelliferae,

Eryngium campestre L. = *Bottoni da camicie, Calcatreppola*. Sulle rampe sterili dei viottoli, e su terreno a base di tassello: sui colli compresi fra il Cimitero, S. Cristoforo, e S. Bernardino. 4 Luglio-Settembre.

ZAN: (Eryngium vulgare. C. B. Pin. 386) (III).

Eryngium amethystinum L. = *Calcatreppolo ametistino*. Tanto in luoghi sassosi e solatii, quanto in luoghi erbosi, frequente; p. e.: m. Ronco, Montecalvo, Santiane, Piani di Malio, Medossi, Zuccolo, Castel Venere e giù per tutta la Costiera. 4 Luglio-Ottobre.

VOLG: *Spin celeste, Stelle spinose*.

ZAN: (Eryngium amethystinum montanum tenuifolium. Tournef. Instit. R. H. 115).

Los: Capodistria, in luoghi aridi; C, AeM (1860); dintorni di S. Ant., Covedo, Sterpeto, e Pinguente (1864).

Eryngium maritimum L. = *Calcatreppola marina, Erba di S. Pietro*. Nelle ghiaie e nelle aspredini della spiaggia, saltuario e piuttosto raro: dal porto di Salvore alla Lanterna, e a Val di Piano. 5 Luglio-Agosto.

Los: Isola. Oltre, alla spiaggia (1860).

Apium graveolens L. = *Sedano, Apio palustre*. Coltivato diffusamente negli orti, nei fossi di Canedo e del Marrocco, là ove l'acqua sorgiva dei così detti *bolasi* si frammeischia a quella marina. Raro. ♀ Giugno-Luglio.

VOLG: *Seleno*.

Los: Risano, nei fossi (1860).

Petroselinum sativum L. = *Prezzemolo*. Coltivato negli orti, ma anche inselvaticchito, p. e. nei coronali di Vallisella. ♀ Luglio-Agosto.

VOLG: *Perzemolo*.

Ptychotis ammoides Koch. = *Ammi bastardo*. Qua e là lungo le strade secondarie della Madonna del Carso, e di Groppie. ♀ Giugno.

Carum Carvi L. = *Comino*. Lo trovai una volta ai margini d'un campo a Corte d'Isola, ed un'altra in un viottolo di Sezza; può essere accidentale o fuggiasco da qualche orto. ♀ Aprile-Maggio.

Los: S. Nazario, nei prati; C, AeM (1860).

Pimpinella saxifraga L. = *Tragoselino becchino*. In luoghi sterili e sassosi nelle pendici più basse di Pazzugo, del m. Ronco, di Loreto, di Draga, e fra l'erbe dei luoghi rocciosi di Spezieria, e Madonna del Carso. 2^o-Luglio-Agosto.

ZAN: (Pimpinella saxifraga, major, umbella candida, C. B. Pin. 159) (VI).

Los: Capodistria, in luoghi erbosi, C, AeM (1860).

Los: **Pimpinella magna L.** = *Tragoselino maggiore*. A Pinguente nella Valle del Quieto (1864).

Berula angustifolia Koch. = *Erba cannella, Sedanina d'acqua*. In luoghi acquitrinosi, e intorno ai così detti lachi: stagno presso alla villa Righetti, Fontana maggiore, e Cortina. 2^o Agosto.

Los: Pradisioi, lungo i fossi (1860).

Bupleurum tenuissimum L. = *Bupleuro grappoloso*. Sparso nelle parti erbose delle banchine delle saline: Strugnano, Fasano, e Sicciole. ♀ Agosto-Settembre.

Los: Capodistria, prati salmastri al mare (1864).